

הנחיות למטופל לקראת ביופסיית היתוך (Fusion) של הערמונית

שלום רב,

לקראת ביצוע הפעולה, ריכזנו עבורך את המידע הנחוץ כדי לעבור את ההליך בצורה הבטוחה והמדויקת ביותר. למידע נוסף והעמקה בנושא מומלץ לקרוא באתר האינטרנט שלי בכתובת - <https://dr-saidian.com>.

ביופסיית היתוך (Fusion) של הערמונית היא שיטת האבחון המתקדמת ביותר כיום בחשד לסרטן הערמונית. הבדיקה משלבת נתונים מקדימים מבדיקה ה-MRI שלך עם הדמיית אולטרסאונד בזמן אמת, מה שמאפשר לנו לנווט ולדגום בדיוק מרבי את האזורים החשודים. הפעולה מבוצעת בד"כ תחת הרדמה מלאה כדי להבטיח שלא תחוש אי-נוחות, היא אורכת כחצי שעה, וההתאוששות ממנה היא בדרך כלל קלה ומהירה.

מסמכים ובדיקות שיש להביא (Checklist)

לצורך הפעולה ועל מנת למנוע עיכובים, עליך להצטייד מראש במסמכים ובתוצאות הבדיקות הבאות:

מסמך / בדיקה	דגשים
דיסק ופענוח MRI	חובה: לא ניתן לבצע את הבדיקה ללא הדיסק הפיזי של ה-MRI עם דו"ח הפענוח.
סיכום מידע רפואי	סיכום מידע רפואי מרופא המשפחה, כולל רשימת התרופות העדכנית
הפניה מאורולוג	הפניה תקפה ומפורטת לביצוע ביופסיית פיוז'ן.
בדיקות דם ושתן	ספירת דם, (CBC) כימיה (קריאטינין, אוריה, גלוקוז) תפקודי קרישה, בדיקת שתן כללית ותרבית שתן עקרה.
א.ק.ג (ECG)	תרשים עדכני ותקין.
צילום חזה	נדרש עבור מטופלים מעל גיל 60 כחלק מהערכת המרדים.
מדללי דם	יש להפסיק טיפול במדללי דם 5-7 ימים קודם הניתוח, אלא היוועץ עם רופא המשפחה / קרדיולוג מטפל במגע לכך.

הכנה ביום הבדיקה (לפני הגעה למרכז הרפואי)

כדי להבטיח את בטיחות ההרדמה ולאפשר לצוות הרפואי לקבל תמונת הדמיה ברורה ואיכותית, עליך להקפיד על ההנחיות הבאות:

- צום:** יש להפסיק אכילת מזון מוצק 8 שעות לפני מועד הניתוח. יש ליטול את התרופות הקבועות (למעט אלו שהונחית להפסיק מראש) עם לגימה קטנה של מים בלבד.
- שתייה:** שתיה צלולה בלבד (מים, תה, קפה ללא חלב!) ניתן עד שעתיים קודם הניתוח.
- חוקן:** כשעתיים-שלוש קודם מועד הניתוח מומלץ לבצע חוקן חד"פ (ניתן לרכוש בבתי המרקחת ללא מרשם רופא כגון: Fleet Enema) וידיא התרופות מיטבית לאחר מכן. שלב זה קריטי כדי להבטיח את ניקיון החלחולת, דבר המאפשר למתמר האולטרסאונד להפיק תמונה מדויקת וחדה של הערמונית.
- דילול דם:** אם הנך נוטל תרופות לדילול דם, עליך להיוועץ עם הרופא המטפל לגבי המועד המדויק להפסקתן לפני הבדיקה. **אי הפסקת מדלל הדם מבעוד מועד עלולה להוביל לדחיית הפעולה!**
- בביופסיית פיוז'ן המבוצעת בגישה הטרנספריונאלית, כפי שמבוצעת ע"י ד"ר סעידיאן, אין צורך בנטילה של אנטיביוטיקה מניעתית קודם הביופסיה באופן שגרתי.

שים לב! ביום הניתוח יש להגיע לדלפק הקבלה כשעתיים לפחות קודם שעת הפעולה. לאחר הפעולה תישאר להשגחה של כשעתיים, עד להתאוששות מלאה מהשפעת חומרי ההרדמה. למען בטיחותך, עליך להגיע למרכז הרפואי עם מלווה. בשל השפעת חומרי ההרדמה, חל איסור מוחלט על נהיגה למשך 24 שעות לאחר הבדיקה.

הנחיות לאחר הבדיקה ותופעות לוואי שכיחות

לאחר הפעולה, הגוף עובר תהליך החלמה טבעי. לא צפויים כאבים חמורים, ניתן להעזר באקמול / אופטלגין לפי הצורך ביממה שאחר הביופסיה. מומלצת שתיה מיטבית, מנוחה ממאמצים והרמות משא כבד למשך מס' ימים אחר הביופסיה. בימים הבאים ייתכן שתבחין בתופעות הבאות, הנחשבות שכיחות וצפויות:

1. **דם בשתן:** עשוי להופיע לסירוגין עד 3 שבועות מיום הבדיקה.
2. **דם בזרע:** עשוי להופיע (בגוון חום או אדום) לתקופה של עד 3 חודשים מיום הבדיקה.
3. **דם בצואה:** עשוי להופיע למשך כ-3 ימים לאחר הבדיקה.

במקרים הבאים יש לפנות מיידית לרופא המטפל או לחדר המיון הקרוב לביתך:

- חום גוף הגבוה מ-38 מעלות.
- אצירת שתן

ביקורת וקבלת תוצאות

- **תוצאות פתולוגיות:** התשובה מהביופסיה מתקבלת בדרך כלל בטווח של שבועיים עד חודש מיום הבדיקה, ותגיע גם לרופא / האורולוג המטפל.
- **המשך מעקב:** עם קבלת התשובה הפתולוגית, אנא קבע תור לביקורת מרפאת ד"ר סעידיאן לצורך הצגת התוצאות והחלטה על המשך הטיפול או המעקב.

לקביעת תור מהיר: 055-4319160

אנו מאחלים לך בריאות שלמה והליך קל ומוצלח.

בברכה,
ד"ר סעידיאן וצוות המרפאה